



LAGERUNGEN

Grundsätzliches 1

Bewußtsein

?



Nein



Stabile
Seitenlagerung



Ja



Lagerung nach
Verletzung

Grundsätzliches 2

Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung



?



Ja

Nein



Schaufeltrage
Vakuummattmatratze


Lagerung nach
Verletzung

Verdacht auf Kopfverletzung, Schädel-Hirn-Trauma



- Kopf-Schulter-Bereich ca. 30° erhöhen

Verdacht auf Bauchverletzung, akute Erkrankung im Bauchbereich



- Knierolle
- Leicht erhöhter Oberkörper

Atemnot, kardiogener Schock



- Erhöhter Oberkörper
- Atmung begünstigen

Volumenmangel




- Oberkörper flach
- Beine erhöhen

NICHT BEI:


- Kopfverletzungen
- Atemnot
- Beinbrüchen

Venenverschuß




- Hochlagern des Körperteils
- Weich lagern!

Arterienverschluß



- Tieflagern des Körperteils
- Weich lagern!

Lungenödem



- Sitzend lagern (auf der Krankentrage)
- Beine möglichst tief lagern



Atemnot und Brustkorbverletzung

- Oberkörper hochlagern
- Auf die verletzte Seite lagern
(wenn für den Patienten erträglich)

Hochschwangere, Gebärende

- Unterstützte Linksseitenlage
- Vena-cava-Kompressionssyndrom:
Behinderung des Blutrückstromes
zum Herzen

Blutung aus der Scheide

- Lagerung in flacher Rückenlage
- Keimfreie Wundauflage
- Beine überkreuzen
(= Lagerung nach FRITSCH)